

ІРИГОСКОПІЯ.

ПІДГОТОВКА ДО РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ТОВСТОЇ КИШКИ (ІРИГОСКОПІЯ).

- ⊕ За 2-3 дні до проведення обстеження необхідно перейти на безшлакову дієту та обмежити вживання вуглеводів, тобто тих продуктів, які провокують газоутворення та діарею. Дієта має містити продукти, які містять білок: нежирне м'ясо, рибу, курячі яйця, кисломолочні продукти.
- ⊕ Перед проведенням іригоскопії останній прийом їжі має бути о 12:00. Потім обов'язково вживати рідину (мінеральну воду без газу, німецький чай).
- ⊕ О 16:00 – 40-60 мл касторового масла або 100 мл 25 розчину магnezії (50 г порошку на ½ стакану води).
- ⊕ У день проведення процедури за 2 години до неї – 2 очисні клізми (кімнатної температури) по 1,5 л води.
- ⊕ Для повного очищення кишківника, замість очисних клізм, можна використовувати препарат «Фортранс».
- ⊕ Приймати за такою схемою: 1 пакетик – на 15-20 кг ваги. При вазі пацієнта 80 кг використовується 4 пакетики. Один пакетик необхідно розчинити в 1 л питної води кімнатної температури (газовану воду використовувати не можна). Тобто пацієнт із вагою 80 кг повинен випити 4 л розчину. Починати прийом ввечері з 17-18 години і до 22 годин за ніч до обстеження. Отриманий розчин потрібно пити повільно, приблизно по 1 л протягом години (1 стакан за 15-20 хвилин).
- ⊕ Аби покращити смак, можна додати сік лимону або заїсти скибочками лимону. Якщо при вживанні розчину виникає відчуття нудоти, то потрібно зробити паузу на пів години, пізніше продовжити. За 1-2 години після початку прийому препарату з'являться рідкі випорожнення, які мають завершитися через 2-3 години після прийому останньої дози.

Не хвилюйтеся, якщо випорожнення кишківника було недостатнім. Прийом 3 л розчину – це гарантія хорошої підготовки кишківника до проведення іригоскопії